

DERMATOFITOSIS

TERBINAFINA Elección, Bien tolerada, no relación comidas, cefalea, g-i, sabor, rash, ↑transaminasas (medir si >6 s).

O >4 a 1 compr 250 mg qd (<40 kg: 1/2 compr; <20 kg: 1/4 compr). *EFG comp 250 mg (4 y 24)*

Tóp >12 a: 1-2 aplic/d **1-3 sem** hasta resolución *EFG crem 1% (30g) // Lamisil Topico 1% crem, sol y spray (30 ml)*

Alternativas tópicas: <3 a: **Ketoconazol** 1 aplic/d, **Mico** 2 aplic/d, (>3 a: **Eco** 1 aplic/d, **Clotri** 2 aplic/d);
>10 a: **ciclopirox** 1-2 aplic

FLUCONAZOL Similar eficacia. Elecc en lactantes, < 4 a, < datos. G-i, cefalea, rash, ↑transam.

O <4 a: **Dosis semanal**: 6 mg/k qs (3-6 mg/k en onicom.), máx 150 mg pedis/200 mg corporis/300 mg onicom./400 mg capitis. **Dosis diaria**: 6mg/k qd en T. capitis pauta corta 3-6 sem

EFG: caps 50-100-200, susp 50-200mg/5ml

ITRACONAZOL G-i, rash, cefalea, somnolencia, mareos, ↑transam (si >1 m), interacc frec.

Dosis diaria: O 3-5 mg/k/d (máx 200 mg/dosis: c 12 h pedis, onicomiosis, capitis y c 24 h corporis).

Dosis diaria 7 días por mes: O 5 mg/k/d (máx 200 mg c 12 h) en onicom. y capitis.

EFG caps 100 mg.

TINEA CORPORIS Trich rubrum, Microsp Tóp **T** ~Azol/ciclop O T1 s = I 1 s ó F qs 2-4 s

-Anillo -Multiplaca -Pustuloso. **Oral si tóp no cura en 4 s.**

TINEA PEDIS Raro prepub. Trych/E. flocc Tóp **T** ~Azol/ciclop O T 2 s = I 1 s ~ F qs 2-6 s

- Interdigital (DDIF eritrasma), -Hiperqueratósica (asociar ac salicílico). - Vesículo-bullosa

Asociar polvos desecantes pies, antifúngico zapato, evitar deportivas oclusivas. **Oral si tóp no cura en 4 s.**

TINEA CAPITIS

-**MICROSPORUM CANIS**: Ectothrix (zoofílica): Parches descamativos centrífugos lentos+alopecia, DDIF psoriasis, seborreica. O T 4-6 s ~ I qd 4-6 s ó 7/30 d 2-3 m (Si disponible **Griseofulvina microniz 1ª elecc 1 g/d (20 mg/k/d 6-8 s extensible a 12 s a 25 mg/k hasta 2 s postcuración)**)

- **TRICHOPYTON TONSURANS**: Endothrix (antropofílica): Parches alopécicos con puntos negros. DDIF A. areata. O T 4- 6 s ~ F qd 3-6 s/qs 6-12 s

Prurito+ linfadenopatía cervical frec, autoeccematización. Asociar Champú bis convivientes 2-4 s (S. selenio, ciclopirox 1%, ketoco 2%), desinfect peines, ropa. Evaluar animales.

ONICOMICOSIS

O T (76% efectiv)12 s (6 s manos) ~ I (63%) 7d/mes x 3 m (2 m manos) ~ F (48%) 18-26 s(12-16 s manos).

Abreviaturas: d(día):s(semana), m (mes) qd (c24 h), bid (c12), bis (2 x sem), T (terbinafina), I (itraconazol), F (fluconazol), DDIF (diagnóstico diferencial), ~ (segunda elección).