



NOVOS PRODUTOS VACINAIS NO CALENDARIO DE VACINACIÓN INFANTIL (setembro 2017)

INTRODUCCIÓN

A Consellería de Sanidade resolveu o concurso para a adquisición de vacinas para os vindeiros anos 2017-2020. Isto vai supoñer que algúns dos produtos vacinais utilizados ata o de agora no calendario vacinal van cambiar ao ser outro laboratorio o adxudicatario desa vacina neste novo concurso.

Estas modificacións non van supoñer ningún cambio nin na idade, nin nas pautas de administración das vacinas do calendario posto en marcha en xaneiro de 2017.

Os centros comenzarán a recibir estes novos produtos en canto se vaia acabando o stock dos existentes.

Os cambios más relevantes nos produtos vacinais que van a estar dispoñibles ao longo deste ano 2017 ou do ano 2018, son os seguintes:

Vacina Hexavalente: A vacina Infanrix Hexa® do laboratorio GSK substitúese pola vacina Vaxelis® do laboratorio MSD.


Vacina triple vírica: Priorix® do laboratorio GSK, vai ser substituída pola vacina MMRvaxPro® do laboratorio MSD

Vacina fronte a difteria-tétano-tose ferina acelular de baixa carga antixénica: Boostrix® do laboratorio GSK vai ser substituída no ano 2018 pola vacina Triaxis® do laboratorio Sanofi Aventis.

A continuación amósase o calendario de vacinación infantil actual cos produtos vacinais que se van utilizar ao acabar o stock dos existentes.

ADMINISTRACIÓN CRONOLÓXICA DAS VACINAS DO CALENDARIO

Dous meses: Vacinación fronte á Difteria-Tétano-Tose ferina (DTPa), Polio (VPI), *Haemophilus influenzae b* (Hib), Hepatite B (Hep B) e Pneumocócica conxugada (PnC):






Administrarse unha dose de vacina **VAXELIS®** nunha coxa e **PREVENAR 13®** na outra.



	Laboratorio	Presentación	Vía e lugar de administración
VAXELIS®	MSD	Xiringa precargada con 2 agullas separadas. Non haberá que reconstitúila, está xa lista para a súa administración	Intramuscular, na cara anterolateral da coxa.
PREVENAR 13®	Pfizer S.L.U.	Xiringa precargada con agulla separada	

- **Catro meses:** Vacinación fronte á Difteria-Tétano-Tose ferina (DTPa), Polio (VPI), *Haemophilus influenzae b* (Hib), hepatite B (Hep B), Pneumococo (PnC) e Meningococo C (Men C).


Administrárase a 2ª dose de **VAXELIS®**, a 2ª dose de **PREVENAR 13®** e a 1ª dose **NEISVAC-C®**. Deberá gardarse a distancia mínima (2,5 cm) para a administración de dúas vacinas na mesma coxa.



	Laboratorio	Presentación	Vía e lugar de administración
VAXELIS®	MSD	Xiringa precargada con 2 agullas separadas. Non haberá que reconstitúila, está xa lista para a súa administración	Intramuscular, na cara anterolateral da coxa
PREVENAR 13®	Pfizer S.L.U.	Xiringa precargada con agulla separada	
NEISVAC C®	Pfizer S.L.U.	Xiringa precargada con 2 agullas intercambiables de diferente tamaño	



- **Once meses:** Vacinación fronte á Polio (VPI), Difteria-Tétano-Tose ferina (DTPa), *Haemophilus influenzae b* (Hib), Hepatite B (Hep B) e Pneumococo (PnC):
Administrárase a 3ª dose de vacina **VAXELIS®** nunha coxa e a 3ª dose de **PREVENAR 13®** na outra coxa



	Laboratorio	Presentación	Vía e lugar de administración
VAXELIS®	MSD	Xiringa precargada con 2 agullas separadas. Non haberá que reconstitúila, está xa lista para a súa administración	Intramuscular, na cara anterolateral da coxa
PREVENAR 13®	Pfizer S.L.U.	Xiringa precargada con agulla separada	

- **Doce meses:** Vacinación fronte ao Meningococo C (Men C), sarampelo, rubéola e parotidite (TV).

Administrárase a 2ª dose de **NEISVAC-C®** e a 1ª dose de **MMRvaxPro®**.






	Laboratorio	Presentación	Vía e lugar de administración
NEISVAC C®	Pfizer S.L.U.	Xiringa precargada con 2 agullas intercambiables de diferente tamaño	Intramuscular, na cara anterolateral da coxa / rexión externa do músculo deltoide
MMRvaxPro®	MSD	Xiringa precargada (disolvente) e vial (po) para reconstituir, con 2 agullas separadas	Subcutánea na rexión externa do músculo deltoide

- Quince meses:** Vacinación fronte á varicela (VVZ).



Administrarse a 1ª dose de **VARIVAX®**



	Laboratorio	Presentación	Vía e lugar de administración
VARIVAX®	MSD	Xiringa precargada (disolvente) e vial (po) para reconstituir, con dúas agullas separadas	Intramuscular na rexión externa do músculo deltoide / subcutánea en caso de diátese hemorrágica

- Tres anos:** Vacinación fronte ao sarampelo, á rubéola e á parotidite coa vacina Triple Vírica (TV) e fronte á varicela (VVZ).

Administrarse a 2ª dose de **MMRvaxPro®** e 2ª de **VARIVAX®** (esta última só para os nacidos a partir do ano 2015) .





	Laboratorio	Presentación	Vía e lugar de administración
MMRvaxPro®	MSD	Xiringa precargada (disolvente) e vial (po) para reconstituir, con 2 agujas separadas	Subcutánea na rexión externa do músculo deltoide
VARIVAX®	MSD	Xiringa precargada (disolvente) e vial (po) para reconstituir, con 2 agujas separadas	Intramuscular na rexión externa do músculo deltoide / subcutánea en caso de diátese hemorrágica

• **Seis anos:**


Vacinación fronte á difteria-Tétano-tose ferina acelular (dTpa):



	Laboratorio	Presentación	Vía e lugar de administración
Boostrix®	GlaxoSmithKline S.A.	Xiringa precargada con 1 agulla	Intramuscular na rexión externa do músculo deltoide

• **Doce anos:** Vacinación fronte ao meningococo C (MenC), virus do papiloma humano (VPH) e varicela (VVZ), neste último caso só para susceptibles.

Administrarse a 3ª dose de **NEISVAC-C®**, e iniciarase a pauta de VPH con vacina **CERVARIX®**, e no caso de susceptibles á varicela iniciarase a pauta coa vacina **VARIVAX®**.



	Laboratorio	Presentación	Vía e lugar de administración
NEISVAC C®	Pfizer S.L.U.	Xiringa precargada con 2 agujas intercambiables de diferente tamaño	Intramuscular na rexión externa do músculo deltoide
CERVARIX® 2 doses: 0-6 meses	GlaxoSmithKline S.A.	Xiringa precargada e agulla separada.	
VARIVAX® <i>(Só para susceptibles)</i>	MSD	Xiringa precargada (disolvente) e vial (po) para reconstituir, con 2 agujas separadas	Intramuscular na rexión externa do músculo deltoide / subcutánea en caso de diátese hemorrágica

Pautas:

CERVARIX®: 2 doses aos 0-6 meses. Só rapazas.

VARIVAX®: 2 doses. Intervalo mínimo 4 semanas. Só para susceptibles.

- **Catorce anos:** Vacinación fronte ao Virus do Papiloma Humano durante este ano 2017 tamén se

administrarán as rapazas de entre 13 e 14 anos non vacinadas.



	Laboratorio	Presentación	Vía e lugar de administración
DIFTAVAX, Imovax dT, TD toxoids®	Sanofi Aventis / Grifols.	Xiringa precargada con agulla / vial	Intramuscular na cara externa do deltoide
CERVARIX® 2 doses: 0-6 meses	GlaxoSmithKline S.A.	Xiringa precargada e agulla separada	

Santiago de Compostela, 11 de setembro de 2017

O director xeral de Saúde Pública

(Por delegación de sinatura de 04/09/2017)

O subdirector xeral de Programas de Fomento de Estilos de Vida Saudables



Jorge Suárez Hernández